Izsáki Horgász- és Pihenőpark
H-6070 Izsák, 0331/9. hrsz.
Mobil: +36-30/249-6924
E-mail: horgaszto2008@gmail.com Web: www.izsakihorgaszto.hu

Bodorka (Rutilus rutilus LINNÉ)

Egyéb nevei: veresszárnyú koncér, vörösszárnyú keszeg, vereskeszeg, bódorkeszeg

Jegyei: Egyik leggyakoribb halunk. Teste oldalról lapos, mérsékelten magas hátú, legnagyobb magassága a hasúszó kezdeténél mérhető. Szája kicsi és csúcsba nyíló. Szemgyűrűjének színe a halvány narancssárgától az élénk narancsvörösig változhat. A hát zöldesszürke, a has ezüstös fehér. A fiatalok has- és farok alatti úszói még rendszerint fakók, az idősebbeké narancsvörös színezetűek; a páratlan úszók halványabban vörhenyesek.

A táplálékbő vizekben magasabb és szélesebb hátú, ún. „állóvízi" változata fordul elő, szemben a nyúlánkabb, ún. „folyóvízi" egyedekkel. Nagyobb példányainak hossza 15-20 cm, kivételesen 30 cm; testtömegét tekintve a hazai horgászrekord Harka szerint 1995-ben 1,76 kg volt.

Elterjedése: Eurázsiai, széles körben elterjedt pontyféle, nálunk őshonos. Minden vizünkben él. Kedveli a csendesen folydogáló és állóvizű helyeket (pl. a Velencei-tóban tömegesen él), nyáron főleg a hínáros részeket keresi fel.

Életmódja: Fiataljai planktonevők; a fejlettebbek nagyobb planktonrákokkal, férgekkel, rovarlárvákkal és vízicsigákkal táplálkoznak. Április elején, 10-12 °C vízhőmérsékleten, csoportosan ívik. 1-1,5 mm átmérőjű, sárgás, ragadós ikráit algás kövekre, gyökérzetre, vízinövényekre rakja. A háromnyaras nőstények ikramennyisége testsúly-kilogrammonként 20-100 ezer lehet. Csak a 4. évében éri el a 10-15, az 5. évben pedig a 14-16 cm nagyságot. Tehát lassan fejlődő, kis termetű szapora hal.

Jelentősége: Szálkás, kevésbé ízletes hósa miatt nálunk gazdaságilag nem jelentős hal. Viszont jelentős a szerepe a süllő és a csuka táplálkozásában. Káros ugyanakkor mint értékesebb halaink táplálékkonkurense, és mint a kihelyezett fogassüllő-fészkek „ívási parazitája", ugyanis oda lerakott ragadós ikratömegével befullasztja a süllőikra egy részét. Ezért feltétlenül gyérítendő hal. Fogása nem esik korlátozás alá. Apró gilisztával, paprikás kenyérrel, csontkukaccal csalizott horoggal könnyen fogható, de inkább kisebb egyedeit (vagyis önmagát) használják csalihalként.